

第十九期（总第 394 期）

2012年07月31日
植保热线: 84268088

☆☆

美国白蛾



小线角木蠹蛾羽化



青桐木虱危害状



天津市園林綠化研究所

月季黑斑病

国槐小卷蛾

据本次调查国槐小卷蛾二代幼虫危害，已看到明显有被害的干枯变色的小枝悬挂在树冠上，可喷洒 5%吡虫啉乳油防治。本次调查郁江道、解放南路、洞庭路悬挂的诱捕器均见到诱到的成虫，效果较好。二代幼虫严重危害期在 8 月中旬，应在 8 月上旬对二代幼虫做好防治。二代幼虫即为越冬幼虫，一定要处理防治。

小线角木蠹蛾

据调查，小线角木蠹蛾仍有成虫羽化，已近尾声，新一代幼虫已钻蛀危害并排出木屑粪便，当前防治应着重人工挖治新蛀入幼虫，不要等到小幼虫蛀入木质部再进行挖治，那样不仅对树皮伤害大，而且不易防治彻底，最好在幼虫蛀入木质部之前进行挖治，此期还应继续对仍在树体内钻蛀的大龄幼虫进行药剂注射防治。

本次调查又查到小线角木蠹蛾危害西府海棠，为此告知各养管单位在防治白蜡树上的小线角木蠹蛾的同时，应再对西府海棠、海棠、国槐上发生的小线角木蠹蛾进行认真检查，认真防治。

蚜虫

虽受大雨影响，一些蚜虫虫口有所减轻，经查当前仍在危害的蚜虫有白蜡卷叶绵蚜、绣线菊蚜、柳黑毛蚜、毛白杨蚜、棉蚜，以白蜡卷叶绵蚜危害较为严重，应着重进行防治。药剂防治应选用 5%吡虫啉乳油 2000 倍液或 1.2%苦烟乳油 1000 倍液，防治白蜡卷叶绵蚜最好选用 5%吡虫啉乳油或 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液。

月季黑斑病

连日降雨，空气湿度很大，适宜病害发生发展，月季黑斑病是重点防治的对象。凡已发生该病，在植株下面有受害的叶片，应予以摘除，摘除后喷一次杀菌剂进行保护，杀菌剂可选用石硫合剂、百菌清、托布津、多菌灵、粉锈宁等。

其它病虫

当前还应注意防治的病虫有梨星毛虫、棉大卷叶螟、国槐尺蛾、榆绿叶甲、大蓑蛾、青桐木虱、卫矛矢坚盾蚧、紫薇绒蚧、柿绒蚧、日本龟蜡蚧、梨冠网蝽、光肩星天牛、六星黑点豹蠹蛾、沟眶象、杨树溃疡病、白粉病等，应注意检查防治。

八月份防治要点

八月份二代美国白蛾处于严重危害期，也是全年防治的关键时期。8 月上中旬二代幼虫严重危害，常造成吃光现象，中旬可见化蛹、成虫羽化。8 月底即可见三代卵和初孵幼虫，此期为世代重叠危害期，为此应针对各个虫态有的放矢进行人工和药剂防治，防治一定要抓紧。8 月下旬可开始喷洒除虫脲防治三代幼虫。八月份发生的其它食叶害虫还有刺蛾、三代国槐尺蛾、三代杨扇舟蛾的幼虫、大蓑蛾、含羞草雕蛾、黄杨绢野螟和棉大卷叶螟，可喷洒除虫脲 10000 倍液防治国槐尺蛾，1000 倍液苦烟乳油防治其它食叶害虫。

钻蛀害虫注意防治光肩星天牛和小线角木蠹蛾的初孵幼虫，采取人工砸卵和挖治幼虫的方法。还应继续药剂注射防治树体内的大龄幼虫，也应注意防治其它天牛类，注意检查剪除六星黑点豹蠹蛾有虫枯枝杀灭幼虫。注意防治二代国槐小卷蛾幼虫，可采用喷洒 5%吡虫啉或 10%吡虫啉可湿性粉剂 1000~2000 倍液杀灭。

刺吸害虫要注意防治山西品粉蚧、日本龟蜡蚧，8 月下旬注意第三代桑白盾蚧初孵若虫的防治。八月还要注意防治青桐木虱、合欢羞木虱和皂荚瘿木虱，注意防治碧桃、紫叶李、五叶地锦等植物上的叶蝉和危害西府海棠、梨等的梨冠网蝽。及时剪除蝻蛄、蚱蝉产卵造成的枯枝。

草坪应注意防治食叶的淡剑夜蛾和刺吸害虫蝽、叶蝉等，在湿度大、地势低洼地段注意防治草坪病害。

病害方面要注意防治枝干病害，主要是杨树溃疡病和海棠、国槐腐烂病，可涂抹梳理剂（树乐），也可涂抹 100-200 倍多菌灵防治。月季黑斑病要重点防治，可喷洒托布津、百菌清、多菌灵等药剂，应每 7~10 天喷洒一次，药剂一定要喷洒均匀，也应注意白粉病类的防治。