

园林病虫信息

第二十六期（总第 769 期）

天津市城市管理委员会

2024 年 9 月 20 日

天津市城市园林绿化服务中心园林植保部

植保热线：84268088

☆☆

病虫害监测

美国白蛾

据本周调查，美国白蛾第三代幼虫已发育至 4~5 龄，进入暴食期，受害较重的植株部分整枝已被吃光，幼虫开始转移危害周边植物。各养管单位要高度重视，确保全面防治不留死角，尤其公共绿地边角、城乡结合部、居民小区、群管单位应重点检查、持续防治，避免其点、片相连。当前防治以药剂喷雾为主，药剂可选用高氯·甲维盐 1000 倍，在化蛹前应灭尽灭，最大程度降低越冬基数。有条件的单位可提前于树干绑草帘或毛毡诱集化蛹。9 月底至 10 月初将组织第二轮释放小蜂，请各单位提前准备。



美国白蛾网幕




美国白蛾幼虫



毛粘诱集美国白蛾化蛹

棉铃虫

据近日调查，棉铃虫继续危害月季、美人蕉、木槿、大花秋葵等，低龄幼虫取食叶片、花蕾危害，大龄幼虫蛀入花蕾、花朵致花蕾死亡。该虫少量为害时，可人工捕捉或剪除有虫花蕾；虫量大时可喷洒 1.2% 烟参碱乳油 1000 倍液或 20% 灭幼脲悬浮剂 6000 倍防治。



棉铃虫幼虫

棉大卷叶螟


据本周调查，棉大卷叶螟幼虫仍在危害木槿、大花秋葵等植物，造成大量卷叶、碎叶甚至枯焦，虫龄不一。该虫于 10 月中下旬越冬，还将危害一段时间，此期可摘除苞叶和喷洒 5.7% 甲维盐水分散剂 3000 倍液进行防治。



棉大卷叶螟幼虫

榆绿叶甲、榆黄叶甲


据近期调查，该两种叶甲危害榆树、金叶榆、榆树绿篱等日趋严重。当前成虫、幼虫同时发生危害，均啃食叶肉呈穿孔网眼状，危害严重时可造成整个树冠或点片绿篱枯黄。成虫除危害植物叶片外，还可在植株周围或居民窗外乱飞，寻找适宜的越冬场所，可造成扰民，应注意检查防治，防治药剂可选用 5% 阿维·氟铃脲 1500 倍液。



榆绿叶甲成虫、幼虫危害状

斑衣蜡蝉

据本周调查，斑衣蜡蝉成虫聚集于树干中下部，数量较多，此期雌成虫即将产卵，卵除了产于椿树外，也常产在白蜡、槐、海棠等其周边的树种上。在成虫较集中、数量较多的地段，应喷洒 25% 噻虫嗪水分散粒剂 6000~7000 倍液杀灭。



斑衣蜡蝉雌成虫

紫薇绒蚧

据本周初调查，石榴、紫薇上紫薇绒蚧为第二代若虫盛发期，当前也为防治适期，对毡囊量大的枝干加强修剪的同时，可喷洒 10% 吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液杀灭，以降低越冬基数，减少翌年危害。



紫薇绒蚧

光肩星天牛

据近日调查，光肩星天牛新蛀入幼虫正大量蛀食危害，以储存营养准备过冬，受害树干可见大量排粪孔。此期至 10 月上旬应抓紧进行人工注射防治。



光肩星天牛幼虫倒木屑