

筛网状；黄刺蛾、双齿绿刺蛾幼虫虫龄不一，危害月季、白蜡、西府海棠等，群集于叶片背面蚕食叶肉，残留表皮，呈半透明状。此期可喷洒 3.4% 甲维盐 1000 倍液、8% 噻虫胺·高效氯氰菊酯 2000 倍或 15% 茚虫威悬浮剂 2500~3000 倍液防治。

桃剑纹夜蛾

据本周初调查，于紫叶李上发现桃剑纹夜蛾幼虫食叶危害。该虫一年发生 2 代，还可危害桃、梨、樱桃、杏等植物，初孵幼虫群集在叶背，取食叶肉残留表皮，稍大分散食叶成缺刻和孔洞，幼虫发生期集中在 7~9 月，10 月老熟幼虫入土化蛹越冬。虫量小时可人工摘除，虫量大时应喷洒甲维盐防治。



桃剑纹夜蛾幼虫

杨扇舟蛾


杨扇舟蛾主要危害杨、柳树，一年中 5~9 月均可见幼虫危害。初孵幼虫群居，剥食叶肉，2 龄后缀叶形成叶苞，在内啃食叶肉，3 龄后分散危害，严重时可将整株树木的叶片吃光。据本周调查，当前虫龄 3 龄，此期可喷洒 20% 甲维·虫酰肼 1000 倍液防治。



杨扇舟蛾幼虫

青桐木虱


据本周调查，青桐木虱危害较普遍，白色絮状物布满青桐的枝杈、叶片和果实部位，尤其叶片背面木虱成虫较多，虽前期受降雨冲刷影响，虫量有所减轻，但不可大意，可喷洒 10% 吡虫啉 2000 倍液或阿维菌素 3000 倍液防治，每隔十天喷一次，大雨过后需及时补喷。



青桐木虱危害状

柿绒蚧

据本周调查，柿绒蚧危害日益严重，已进入第三代若虫孵化盛期，该蚧以若虫、雌成虫群集枝梢、叶背、叶柄、果实及柿蒂与果实相结合的缝隙处危害，刺吸汁



柿绒蚧

液。当前对尚未结蜡的可喷洒 25% 噻虫嗪可湿性粉剂 1500 倍液；若虫开始结蜡期可喷洒 6% 吡虫啉液剂 1000 倍液防治。

桧柏臀纹粉蚧

据本周初调查，桧柏臀纹粉蚧正在危害龙柏，寄主植物还有侧柏、刺柏、圆柏等，主要危害当年生枝干、鳞叶基部、鳞叶。当前以雌成虫和若虫吸



桧柏臀纹粉蚧造成针叶发黄、枝条干枯煤污

取寄主汁液危害，同时分泌大量蜜露，诱发煤污病，影响寄主的光合作用，造成针叶发黄、早落、枝条枯死等。当前可先对密集虫枝和枯枝进行剪除，再喷洒 42% 噻嗪·毒死蜱乳油、5% 高氯·甲维盐微乳剂、螺虫乙酯等，每 5~7 天喷 1 次，连续防治 3 次以上。

斑衣蜡蝉


据近日调查，斑衣蜡蝉成虫数量增多，该虫 8 月下旬进入交尾产卵期，当前尚未查到卵块，应对栖息数量较大的地段应喷洒 1.2% 烟参碱乳油 1000 倍液杀灭成虫，减少产卵。



斑衣蜡蝉成虫

桑始叶螨

据本周初调查，桑树上桑始叶螨进入严重危害期，轻者沿叶脉两侧正反两面散见白色斑点，重者各脉两侧白斑密布，相连成串，变黄变褐，全叶枯黄，甚至干枯脱落，喷洒清水对降低螨害有一定效果，药剂防治可选择阿维菌素、蚧螨灵等。



桑始叶螨危害状



六星黑点豹蠹蛾

据本周调查，六星黑点豹蠹蛾幼虫已蛀入危害白蜡、法桐、柳树、石榴、海棠等，受害枝条从蛀入处向梢部萎



六星黑点豹蠹蛾幼虫及蛀孔

蔫，干枯，没有明显的倒沫现象，与蝉产卵的干枯枝应注意区分，8 月份是该虫危害最严重的月份，可采取人工剪除虫枝的方法进行防治，剪除时应在枯枝后 10 公分处剪除为宜。

国槐小卷蛾

据近日调查，国槐小卷蛾二代幼虫蛀食叶柄基部及槐豆荚，造成大量复叶干枯脱落，当前应喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液防治，每隔 7~10 天喷洒 1 次，连续喷洒 3 次。



国槐小卷蛾幼虫蛀食槐豆荚

白粉病

据近日调查，多种园林植物：法桐、海棠、黄杨、月季、枸杞等多有白粉病发生，为此，建议及时清除杂草（已染病植株），然后喷洒粉锈宁或甲基托布津进行交替防治，雨后及时补喷。



海棠白粉病