

第二十期（总第 763 期）

植保热线：84268088

双线棘丛螟

双线棘丛螟是我市城市绿地外来入侵物种，据本周调查，该虫危害火炬和黄栌日趋严重，幼虫吐丝将多叶粘成巢状或筒状，居于其中取食，可喷洒 20%除虫脲 4000 倍液进行防治。



双线棘丛螟危害状

日本龟蜡蚧

据本周调查，日本龟蜡蚧在多种园林植物上有发生：法桐、白蜡、枣树、黄杨、花椒、月季、石榴、紫薇、碧桃、毛白杨等。当前该虫雌雄虫已开始分化，雄虫蜡壳星芒状，雌虫龟甲状，多在叶片正面或枝条上附着危害，此期可喷洒蚧螨灵 80~100 倍液防治，也可人工剪除有虫枝叶防治。



日本龟蜡蚧

娇膜肩网蝽

据本周调查，娇膜肩网蝽危害柳树日趋严重，该蝽主要为害叶片背面，分泌褐色烟油状排泄物，受害叶片正面出现灰白色褪绿斑点，危害过重将导致叶片大量焦黄。此期可喷施 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液杀灭，注意雨后及时补喷。



娇膜肩网蝽及危害状

竹裂爪螨

据本周调查，竹裂爪螨在竹类植物普遍发生。该螨群集于竹叶背面，结丝网多沿叶脉或叶缘整齐分布，叶片正面对应位置的出现黄褐色斑块，大量发生时造成竹子枯黄落叶，降低观赏价值。当前可竹腔打孔注射 1.8%阿维菌素 10 倍液，或喷洒 5%甲维盐微乳剂 2000 倍液，注意叶背着药。



竹裂爪螨危害状

国槐小卷蛾

据调查，当前二代国槐小卷蛾幼虫蛀入危害，可见较多干枯复叶，应抓紧时机喷洒 4.5% 高效氯氰菊酯 1000~2000 倍液防治。



国槐小卷蛾危害状

臭椿沟眶象

据近日调查，臭椿沟眶象成虫继续羽化、交尾、产卵，多位于树干中下部。此期可选用 8% 高效氯氰菊酯微胶囊剂 200 倍液喷施于树干防治成虫，也可随手杀灭，注意该虫有假死性。



臭椿沟眶象交尾

月季黑斑病、褐斑病

近期持续高温高湿，月季黑斑病、褐斑病将日趋严重，尤其环境郁闭，群体种植区将发病严重。两种病害的主要区别是：黑斑病病斑为黑色圆斑，边缘呈放射状，褐斑病病斑多发生在叶缘和叶脉间，不规则状黄褐斑，两种病后期都引起早期脱落，植株生长衰弱，甚至死亡，防治应及时清理病枯枝，减少二次侵染源。同时在晴好天气下，抓紧喷洒杀菌剂，如 1000 倍液百菌清、退菌特、多菌灵、福美双等，交替使用，每半月喷一次为宜。



月季黑斑病

蜗牛

雨后蜗牛发生数量较大，常常数十头乃至上百头在树上危害，将植物叶片咬食呈网状孔洞，也可啃食稚嫩皮层乃至部分老树皮。受害植株可见蜗牛排出的黑色粪便，以及爬行留下的亮白色线带。植物枝干受害后创伤难愈，为病菌提供了入侵途径，且蜗牛自身携带病菌。此期应采取喷施专用杀蜗剂或引诱剂等方法进行防治。



树干上聚集的蜗牛

八月份防治要点

食叶害虫：8 月份美国白蛾世代重叠严重，上中旬将出现二代大龄幼虫、老熟幼虫和蛹，中下旬可见二代成虫、三代卵和初孵幼虫，是防治二代美国白蛾的关键月。根据不同虫态出现的时期分别采用剪网幕、喷洒除虫脲、大龄幼虫喷洒高氯.甲维盐和虫酰肼、挖蛹、捕成虫防治。其他食叶害虫注意防治刺蛾、柳毒蛾、棉大卷叶野螟、三代国槐尺蛾，第三代杨扇舟蛾等。

刺吸害虫：8 月份发生的刺吸害虫注意花灌木叶螨、槐蚜、棉蚜等，蚧虫应注意防治日本龟蜡蚧、金叶女贞粉蚧和桑白盾蚧（8 月下旬为若虫孵化期），其次要注意防治木虱、叶蝉、网蝽、斑衣蜡蝉等，注意剪除蟪蛄蝉、蚱蝉产卵造成的枯枝。

钻蛀害虫：8 月份小线角木蠹蛾、光肩星天牛为低龄幼虫危害期，应采用人工挖治，并对大龄幼虫进行注射防治。六星黑点豹蠹蛾危害严重路段，8 月份将在乔木树冠上出现大量枯枝头，大大影响观瞻，应及时剪除枯枝焦叶。二代国槐小卷蛾幼虫蛀入并转移危害，应注意检查防治。

草坪害虫：在草坪地还应注意防治淡剑夜蛾、粘虫、地老虎、蝼蛄、盲蝽、叶蝉的危害。

病害：由于近期雨水较多，高温高湿的气候条件，草坪病害将加重，月季上注意防治黑斑病，黄杨上注意防治白粉病，可喷洒托布津、百菌清、粉锈宁等。枝干病害主要是杨树溃疡病和海棠、国槐腐烂病，可涂抹梳理剂，也可涂抹 100～200 倍多菌灵防治。